

# Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) et Maladie Hémorragique Epizootique (MHE)

## Produits de désinsectisation utilisables pour le traitement des ruminants

Dans le cas de la FCO et de la MHE, en l'absence de produit disposant d'une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) spécifique dans l'indication *culicoïde sp*, les textes préconisent l'utilisation de produits à base de pyréthrinoïdes. Les durées d'action ne sont donc pas celles prévues dans la notice du médicament. **Généralement, il est considéré que les produits ont une action contre les culicoïdes de l'ordre de 7 à 10 jours.**

MEDICAMENT	UTILISABLE CHEZ			ADMINISTRATION	DOSE
	BOVINS	CAPRINS*	OVINS		
<b>BUTOX 7,5 Pour-on (deltaméthrine)</b>	OUI	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour-on sur la ligne du dos	10 ml/bovin de moins de 100 kg – 20 ml/bovin de 100 à 300 kg –30 ml bovins>300 kg (ovins : selon prescription vétérinaire)
<b>BUTOX 50% (deltaméthrine)</b>	OUI	NON	OUI	Immersion ou pulvérisation	60 ml pour 100 l d'eau
<b>VERSATRINE (deltaméthrine)</b>	OUI	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour-on sur la ligne du dos	10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire)
<b>DELTANIL 10MG/ML (deltaméthrine)</b>	OUI	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour-on sur la ligne du dos	10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire)
<b>DECTOSPOT 10MG/ML (deltaméthrine)</b>	OUI	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour-on sur la ligne du dos	10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire)
<b>INSECINOR 10MG/ML (deltaméthrine)</b>	OUI	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour-on sur la ligne du dos	10 ml / bovin – (ovins : selon prescription vétérinaire)
<b>ECTOFLY 12,5 MG/ML (cyperméthrine)</b>	NON	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pulvérisation en éventail sur toutes les zones à protéger	Jusqu'à 25kg, 20 ml- de 25kg à 40kg, 30ml-plus de 40kg, 40ml ( <b>posologie retenue :la plus élevée</b> )
<b>SEBACIL (phoxim)</b>	(OUI mais pas avec cette indication)	(OUI mais pas avec cette indication)	(OUI mais pas avec cette indication)	Balnéation, pulvérisation ou friction à l'éponge	après dilution et selon prescription vétérinaire par espèce <b>Autre : interdit laitière, pas de LMR lait</b>

\* C'est la prescription du vétérinaire pour les caprins qui doit spécifier les modalités d'administration, les doses d'emploi et les délais d'attente